

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី (គ្រុនផ្តាសាយបក្សី) H7N8 ព័ត៌មានសម្រាប់កម្មករកសិដ្ឋាន និងអ្នកម៉ៅការ។



ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី អាចឆ្លងរាលដាលយ៉ាងងាយស្រួល និងបណ្តាលឱ្យស្លាប់នៅក្នុងសត្វមាន់ ក្ដាន ទ្រូគី និងបសុបក្សីដទៃទៀត។ វាកម្រប៉ះពាល់ដល់មនុស្សណាស់។

- កន្លែងបោះចោលដែលមានការអនុញ្ញាត (ADS) - ជាកន្លែងដែលសត្វស្លាប់ សំរាម និងផលិតផលផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានបោះចោលដោយសុវត្ថិភាព។

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីនៅតំបន់ Euroa

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីត្រូវបានគេរកឃើញនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបសុបក្សីក្បែរតំបន់ Euroa កាលពី ថ្ងៃ ទី ៩ ខែកុម្ភៈ។ វាគឺជាអំបូរ H7N8។

វាមិនមែនជាអំបូរ H5N1 ដែលកំពុងសម្លាប់ សត្វស្លាប់ព្រៃបសុបក្សី និងថនិកសត្វមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនោះទេ។

ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីកម្រនឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សនៅបរទេសមួយចំនួនបានឆ្លងមេរោគ និងស្លាប់ដោយសារអំបូរផ្សេងៗគ្នា បន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយសត្វស្លាប់ដែលឆ្លងមេរោគ។ មនុស្សមិនអាចឆ្លងតាមការបរិភោគស៊ុតឆ្អិន ឬសាច់មាន់ឆ្អិនទេ។

ការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សី

កសិកម្មរដ្ឋវិចិត្រវៀ (Agriculture Victoria) មានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលបន្ថែមទៀតនៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីដោយការសម្លាប់បសុបក្សីដែលបានឆ្លងមេរោគ និងការសម្អាតរោងចិញ្ចឹម។

កសិកម្មរដ្ឋវិចិត្រវៀ (Agriculture Victoria) អាចប្រកាសអចលនទ្រព្យមួយថាជា៖

- បរិវេណសង្ស័យ (SP) - នៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យនៃការឆ្លង
- បរិវេណឆ្លងមេរោគ (IP) - នៅកន្លែងដែលការឆ្លងមេរោគត្រូវបានបញ្ជាក់

ធ្វើការនៅកន្លែងដែលឆ្លងមេរោគ។

សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពគឺជាអាទិភាពចម្បង។

- **ចុះឈ្មោះចូល និងចុះឈ្មោះចេញពីអចលនទ្រព្យនោះ** - អ្នកត្រូវតែកត់ត្រាវត្តមានចូលរួមរបស់អ្នក។
- **បញ្ចប់វគ្គបំពាក់បំប៉ន** - វគ្គបំពាក់បំប៉ននៅកន្លែងនីមួយៗនឹងរួមបញ្ចូលការគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ និងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងមេរោគ។
- **ការត្រួតពិនិត្យ** - អ្នកត្រួតពិនិត្យកន្លែងបរិវេណឆ្លងមេរោគ (IPSS) ទទួលខុសត្រូវចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សដែលនៅកន្លែងរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកមកពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។
- **ការរាយការណ៍** - រាយការណ៍អំពីស្ថានភាពទាំងអស់ទៅកាន់អ្នកត្រួតពិនិត្យកន្លែងនោះដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬអាចបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់នរណាម្នាក់។

ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន

ឧបករណ៍ការពារដែលអ្នកពាក់អាស្រ័យលើការងាររបស់អ្នក។

សម្រាប់ការងារណាមួយអ្នកគួរតែពាក់៖

- ឧបករណ៍ដកដង្ហើម P2 ដែលប្រើហើយអាចបោះចោលបាន។ ត្រូវតែបិទជិតមុខ។

- ខោអាវពាក់គ្របដងខ្លួនដែលប្រើហើយអាចបោះចោលបានមានគម្របក្បាលដើម្បីគ្របសក់ដូចដែលបានផ្តល់។
- ស្រោមដៃធន់នឹងសារធាតុគីមីពីរគូ ពាក់មួយគូពីលើគូមួយទៀត។
- ស្បែកជើងកែវ។

ក្នុងអំឡុងវគ្គបំប៉នរបស់អ្នក យើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបពិនិត្យមើលឧបករណ៍ដកដង្ហើម P2 របស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងរបៀបពាក់ និងដោះសម្លៀកបំពាក់ការពាររបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កសិកម្មរដ្ឋវិចិត្រ (Agriculture Victoria) នឹងកំណត់តំបន់ហានិភ័យទាប ដែលអ្នកអាចសម្រាកដើម្បីដឹកទឹកបាន។

ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនដែលខូច។

ប្រសិនបើមានបញ្ហាជាមួយឧបករណ៍របស់អ្នកសូមឱ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក និងអ្នកត្រួតពិនិត្យកន្លែងឆ្លងមេរោគបានដឹង។

នេះរួមមាន៖

- ប្រសិនបើម៉ាស់របស់អ្នកមិនគ្របច្រមុះរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងការលាងដោយប្រើសម្ពាធ។
- ប្រសិនបើឧបករណ៍សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកខូច រហែក ឬដាច់ ហើយអ្នកប៉ះពាល់នឹងវត្ថុដែលអាចឆ្លងមេរោគ ដូចជាសត្វស្លាប់ដាច់ លាមកសត្វ និងផ្លូវ។
- ប្រសិនបើអ្នកប៉ះភ្នែក មាត់ ច្រមុះ ឬម៉ាសរបស់អ្នកបន្ទាប់ពីប៉ះវត្ថុដែលអាចឆ្លងមេរោគ ដូចជាសត្វស្លាប់ដាច់ លាមកសត្វ និងផ្លូវ។
- ប្រសិនបើអ្នកឈឺ។

ប្រសិនបើអ្នកមានជំងឺផ្តាសាយ គ្រុនផ្តាសាយ បញ្ហាក្រពះពោះវៀន ឬមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួននោះអ្នកមិនគួរចូលក្នុងអចលនទ្រព្យដែលឆ្លងមេរោគកន្លែងកែច្នៃ ឬផ្ទះបសុបក្សីណាមួយឡើយ។ ការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយឱកាសនៃជំងឺផ្តាសាយមនុស្សមកជាមួយនឹងជំងឺផ្តាសាយបក្សី។

បន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងបរិវេណដែលឆ្លងមេរោគ

បន្ទាប់ពីវត្តមានចូលរួមនៅបរិវេណដែលបានសង្ស័យបរិវេណដែលឆ្លងមេរោគ ឬបរិវេណចោលសំរាមដែលបានអនុញ្ញាត អ្នក មិនត្រូវមានការប៉ះពាល់ជាមួយបសុបក្សីនិងជ្រូកទេ។

- កុំចូលទៅមើលអចលនទ្រព្យនៅកន្លែងចិញ្ចឹមបសុបក្សីពាណិជ្ជកម្ម (បក្សីជាង 200 ក្បាល) ឬសត្វជ្រូករយៈពេល 72 ម៉ោង ឬ
- កុំប៉ះពាល់រយៈពេល 48 ម៉ោងជាមួយបសុបក្សីចិញ្ចឹម ឬសត្វជ្រូកនៅឆ្លាតក្រោយផ្ទះ។ អ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវរៀបចំឱ្យមានអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ចំណី និងទឹកដល់សត្វ។

តាមដានរោគសញ្ញា នៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីរយៈពេល 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចូលរួមរបស់អ្នក។

រោគសញ្ញាដែលបានរាយការណ៍នៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយបក្សីចំពោះមនុស្សមានចាប់ពីរោគសញ្ញាដូចជំងឺផ្តាសាយធម្មតា (ឧទាហរណ៍ ជំងឺភ្នែកក្រហម ហៀរសំបោរ ឈឺបំពង់ក ក្តៅខ្លួន បញ្ហាក្រពះពោះវៀន) រហូតដល់ក្អក ឈឺសាច់ដុំ រលាកស្ប ការពិបាកដកដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរ។ ក្នុងករណីដោយកម្រ ការស្លាប់អាចកើតឡើង។

ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញានៃជំងឺគ្រុន ផ្តាសាយបក្សី

- ជួនដំណឹងដល់អ្នកត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នក។
- ស្វែងរកដំបូន្មានពីអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈ ក្នុងតំបន់របស់អ្នកតាមទូរសព្ទលេខ 1300 651 160។
- ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ពីព្រោះអាចត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ឱសថ។

សញ្ញានៃជំងឺផ្តាសាយបក្សីនៅក្នុងសត្វរបស់អ្នក

ប្រសិនបើសត្វរបស់អ្នកបង្ហាញសញ្ញានានានៃជំងឺសូមទាក់ទងភ្លាមៗទៅពេទ្យសត្វក្នុងតំបន់របស់អ្នក បុគ្គលិកសុខភាព និងសុខុមាលភាពសត្វនៃកសិកម្មវិចិត្រ (Agriculture Victoria) ឬបណ្តាញទូរសព្ទបន្ទាន់ជំងឺសត្វតាមលេខ 1800 675 888។

កាត់បន្ថយឱកាសនៃការឆ្លងមេរោគ

អនុវត្តអនាម័យល្អនៅពេលពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព

- ជៀសវាងការប៉ះមាត់ ភ្នែក និងច្រមុះរបស់អ្នក
- គ្របដណ្តប់ការកាត់ដាច់ ឬការកោសដាច់ជាមួយស្បែកពាក់ធន់នឹងទឹក នៅក្រោមឧបករណ៍សុវត្ថិភាព (មានយថា បង់រ៉ូប៊ូស)
- កុំបរិភោគ ឬផឹក ខណៈពេលកំពុងពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព។ វានឹងមានតំបន់ពិសេសដើម្បីធ្វើដូច្នោះ
- ត្រូវប្រាកដថាឧបករណ៍សុវត្ថិភាពត្រូវបានដកចេញដោយសុវត្ថិភាព និងតាមលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវ (ស្វែងរកការណែនាំពីអ្នកត្រួតពិនិត្យកន្លែង)
- លាងដៃ និងមុខរបស់អ្នកឱ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីដកឧបករណ៍សុវត្ថិភាព និងងូតទឹកនៅចុងបញ្ចប់នៃវេនការងារនៅផ្ទះ ឬនៅការិយាល័យ មុនពេលចាប់កាន់សត្វដទៃទៀត។

អ្នកដែលធ្វើការជាមួយសត្វបក្សី ឬការរាតត្បាតនៃជំងឺផ្តាសាយបក្សី គួរតែចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយតាមរយៈយ៉ាងហោចណាស់ពីរសប្តាហ៍មុនពេលចាប់ផ្តើមការងារ។